Variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV (ha-Myxovirus) - Nota Ministero del 2/10/26

TARGET	CONIGLI e LEPRI allevati o SELVATICI con lesioni e/o sintomi compatibili con Mixomatosi (anche deceduti durante il trasporto)
METODI DI SORVEGLIANZA	PASSIVA (animali con lesioni e/o sintomi clinici) in allevamento, durante il prelievo venatorio, durante il trasporto
SINTOMI CLINICI	depressione del sensorio, ipertermia, congiuntivite sierosa/purulenta, edema e congestione delle mucose genitali
LESIONI	noduli mixomatosi su testa, muso, zampe, orecchie, edema palpebrale
VERBALE DI ACCOMPAGNAMENTO	**Selvatici**: verbale ARVET Piano Selvatici_Sorveglianza Passiva **Allevati**: verbale campioni ordinari
MATRICI DA CAMPIONARE	**animale in toto**, o lesioni palpebrali/congiuntivali e noduli cutanei. In assenza di lesioni classiche: **animale in toto** o polmone, apparato genitale, tampone mucosa congiuntivale e tampone nasale
ATTIVITA' IZSPLV	real-time PCR (Manuale WOAH Capitolo 3.7.1.) per screening e discriminazione Variante Toledo-MYXV PCR per esclusione ceppo vaccinale in caso di negatività per Variante Toledo-MYXV e positività a screening Segnalazione positività per Variante Toledo-MYXV o Ceppo Classico (non vaccinale)